

Warme Nationale Nachtvliedernacht

Ties Huigens **Tekst:** Op vrijdag 6 september was het weer tijd voor de jaarlijkse Nationale Nachtvliedernacht. Op meer dan honderd plekken werd naar nachtvlieders gekeken. Dankzij het goede nachtvliedeweer werden veel vlieders gezien voor de tijd van het jaar. En met veel enthousiaste bezoekers werd het een zeer geslaagd evenement.

Hoewel nog lang niet alle gegevens binnen zijn kunnen we al wel concluderen dat het een goede nachtvliedernacht was. Een aantal soorten was algemeen en werd op bijna alle locaties wel gezien, zoals gamma-uil, huismoeder en zwarte c-uil. Ook appeltak, lieveling, haarbos, bruine snuituil en koperuil werden veel doorgegeven.

Wageningen

In het Arboretum Belmonte in Wageningen stonden leden en medewerkers van de nachtvliedewerkgroep KNNV-Wageningen, de Werkgroep Vlinderfaunistiek en De Vlinderstichting met vijf opstellingen met lamp en laken. Daarnaast waren er twaalf eiken en beuken met een stroopmengsel ingesmeerd. Na een flinke bui aan het eind van de middag was het 's avonds droog en warm. Om half negen begon het al flink te schemeren en werden de eerste vlieders gezien.

Fraaie soorten

Naar schatting meer dan honderd bezoekers konden genieten van een scala aan soorten: 53 soorten



Getekende gamma-uil.

macro- en 15 soorten micronachtvlieders. De meeste vlieders op het laken behoorden tot de soorten zwarte c-uil (*Xestia c-nigrum*) en huismoeder (*Noctua pro-nuba*). Beide hebben sinds het begin van de Nationale Nachtvliedernacht in 2005 vaker op nummer 1 gestaan in de landelijke top tien van soorten macronachtvlieders. Fraai gekleurde soorten op het laken waren dit keer de hagedoornvlinder (*Opisthograptis luteo-lata*), koperuil (*Diachrysis chrysitis*) en braamvlinder (*Thyatira batis*). Leuke, vrij zeldzame soorten voor het Arboretum Belmonte waren verder de getekende gamma-uil (*Macdunnoughia confusa*) en de gelijnde grasuil (*Tholera decimalis*).

Veel vlieders op stroop

Hoewel één van de gidsen (ik noem geen naam) de weg in het donker even kwijtraakte, werden er tijdens drie lange stroopronden veel vlieders gezien, met name veel exemplaren van de huismoeder en piramidevlinder (*Amphipyra pyramidea*), en zeker ook één schijn-piramidevlinder (*Amphipyra berbera*). Andere soorten op smeer waren de vierkantvlekuil (*Xestia xanthographa*), kooluil (*Mamestra brassicae*), lieveling (*Timandra comae*), paardenbloemspanner (*Idaea seriata*), agaatvlinder (*Phlogophora meticulosa*) en zelfs de zeldzame witte-l-uil (*Mythimna l-album*). Interessant was dat vlieders voornamelijk op de stroop op eik zaten en minder op die op beuk.

Al met al waren de organisatoren bijzonder tevreden over een avond/nacht met veel vlieders en enthousiaste bezoekers. Om een van hen te citeren: "Het was weer beregezellig!"

De resultaten van de Nachtvliedernacht in de rest van Nederland zullen worden gepubliceerd in een van de volgende nummers van Vlinders.



Het vertrouwde beeld tijdens de nachtvliedernacht: laken, lamp en nieuwsgierige kijkers.