



Zoek de verschillen

De recordtemperaturen in de eerste periode van maart wisten tal van overwinterende vlinders vroeg uit hun schuilplaatsen te lokken. Met name de kleine vos werd veel gezien. Aan voedsel geen gebrek want ook voorjaarsbloeiende nectarplanten waren er extra vroeg bij. Wat mij nooit eerder zo was opgevallen is, dat daartoe ook de tuinstruik *Viburnum tinus* behoort. Deze in het Nederlands ook wel 'sneeuwbal' genoemde cultivar is eigenlijk winterbloeiend en doet dat in de regel een paar maanden lang. En dit is waarschijnlijk tevens de reden waarom ik er nu zoveel schoenlappertjes op zag foerageren. Het leek net alsof op elke sneeuwbalstruik

wel één of meer vosjes zaten, tenminste zolang de bloemen door de zon beschenen werden. Ik vond zelfs een struikje met vijftien vlinders. Zoals de foto laat zien, verdrongen ze elkaar bijna.

In vlinderboeken staat dat de mannelijke en vrouwelijke exemplaren er eender uitzien. Toch zijn er bij nadere bestudering van de vlinders op de foto duidelijke verschillen tussen de drie te zien. Bij de ene zijn de kleine zwarte stippen wat groter en bij de ander de gele vlek naast de grote stip. Ook de blauwe maanvlekken aan de vleugelrand zijn qua grootte niet gelijk. Zoek de verschillen! ●

Tekst:
Harm Werners