

Nationale Nachtvliedernacht

Vlindertuin Waalre, 1 juli 2005



Tijdens de Nationale Nachtvliedernacht is in de Vlindertuin gevangen met behulp van de volgende methoden:

- 1 Verticaal gespannen laken, beschenen met een 250 Watt ML-lamp en voorzien van enkele druppels amyl-acetaat (zoet ruikende lokstof). De lamp werd van stroom voorzien met behulp van een 650 Watt tweetakt-aggregaat.
- 3 Heath traps voorzien van 9 Watt UV-rijke TL-buisjes werkend op accu's.
- Een mengsel van stroop, bier en spiritus ($\pm 2:1:1$) en enkele druppels amyl-acetaat op bomen gesmeerd.

Er is gevangen van 23:00u tot ongeveer 02:00u. De temperatuur was $\pm 18^{\circ}\text{C}$. Het was bewolkt, maar overwegend droog.

In totaal zijn 54 soorten macro-nachtvlieders gevangen. Deze zijn doorgegeven aan het Nachtvliedersproject (www.jnm.nl/nachtvlieders). Dit project beheert een database waarin momenteel ruim 6000 waarnemingen zitten. Via het nachtvliedersproject (NVP) komen de waarnemingen ook terecht bij De Vlinderstichting, organisator van de Nationale Nachtvliedernacht.

Waargenomen soorten:

Wortelboorders hopwortelboorder	Hepialidae <i>Hepialus humuli</i>	Beervlinders rozenblaadje streepkokerbeertje witte tijger gele tijger	Arctiidae <i>Miltochrista miniata</i> <i>Eilema complana</i> <i>Spilosoma lubricipeda</i> <i>Spilosoma luteum</i>
Eenstaartjes vuursteenvlinder braamvlinder orvlinder berkeneenstaart	Drepanidae <i>Habrosyne pyritoides</i> <i>Thyatira batis</i> <i>Tethea or</i> <i>Drepana falcataria</i>	Uiltjes houtspaander huismoeder bruine breedvleugeluil driehoekuil groente-uil perzikruiduil tweestreepgrasuil gekraagde grasuil - zuringuil vogelwiekje randvlekuil hyena graswortelvlinder gouwe grasuil donker halmuiltje gewone stofuil donkere marmeruil zilverstreep variabele eikenuil koperuil bruine snuituil schaduwsnuituil	Noctuidae <i>Axylia putris</i> <i>Noctua pronuba</i> <i>Diarsta brunnea</i> <i>Xestia triangulum</i> <i>Lacanobia oleracea</i> <i>Melanchra persicariae</i> <i>Mythimna turca</i> <i>Mythimna ferrago</i> <i>Acronicta tridens / psi</i> <i>Acronicta rumicis</i> <i>Dypterygia scabriuscula</i> <i>Rusina ferruginea</i> <i>Cosmia trapezina</i> <i>Apamea monoglypha</i> <i>Apamea remissa</i> <i>Oligia latruncula</i> <i>Hoplodrina octogenaria</i> <i>Protodeltote pygarga</i> <i>Deltote bankiana</i> <i>Nycteola revayana</i> <i>Diachrysis chrysis</i> <i>Hypena proboscidalis</i> <i>Herminia tarsicrinalis</i>
Spanners kleine zomervlinder vlekstipspanner grijze stipspanner gewone bandspanner naaldboomspanner zwartkamdwergspanner gerande spanner donker klaverblaadje gerimpelde spanner oranje iepentakvlinder peper-en-zoutvlinder ringspikkelspanner gewone spikkelspanner witvlekspikkelspanner variabele spikkelspanner witte grijsbandspanner bruine grijsbandspanner witte schaduwspanner	Geometridae <i>Hemithea aestivaria</i> <i>Idaea dimidiata</i> <i>Idaea aversata</i> <i>Epirrhoe alternata</i> <i>Thera obeliscata</i> <i>Gymnoscelis ruffasciata</i> <i>Lomaspilis marginata</i> <i>Macaria alternata</i> <i>Macaria liturata</i> <i>Angerona prunaria</i> <i>Biston betularia</i> <i>Hypomecis punctinalis</i> <i>Ectropis crepuscularia</i> <i>Parectropis similaria</i> <i>Alcis repandata</i> <i>Cabera pusaria</i> <i>Cabera exanthemata</i> <i>Lomographa temerata</i>		
Pijlstaarten dennenpijlstaart	Sphingidae <i>Sphinx pinastri</i>		
Tandvlinders wapendrager eekhoorn witlijntandvlinder	Notodontidae <i>Phalera bucephala</i> <i>Stauropus fagi</i> <i>Drymonia querna</i>		

N.B. *Acronicta tridens* (drietand) en *Acronicta psi* (psi-uil) zijn alleen op basis van genitaalonderzoek en als rups van elkaar te onderscheiden.

Opvallende vangsten



Hopwortelboorder, *Hepialus humuli*. Een slecht lokaal voorkomende soort van natte, grazige plaatsen. Zeker niet gewoon. De 4^e waarneming van deze soort in de database van het NVP (van de 6165).



Vuursteenvlinder, *Habrosyne pyritoides*. Een vrij algemene soort op plaatsen met braamstruweel. Desalniettemin pas de 6^e waarneming van deze soort in de NVP-database.



Kleine zomervlinder, *Hemithea aestivaria*. Een gewone soort op plaatsen met veel bomen. De 28^e waarneming van deze mooie, groene soort in de NVP-database.



Oranje iepentakvlinder, *Angerona prunaria*. Een niet zo algemene vlinder van bomenrijke gebieden in zuid-Nederland. De 2^e waarneming pas in de NVP-database van deze opvallend grote spanner.



Witlijntandvlinder, *Drymonia querna*. Tegenwoordig een slechts lokaal voorkomende vlinder. Uitsluitend in oost-Nederland en alleen op eik. De 3^e waarneming van deze soort in de NVP-database. Deze soort staat overigens niet in de veel gebruikte (Engelstalige) veldgidsen.



Perzikkruiduil, *Melanchra persicariae*. Een vrij algemene vlinder die vooral in en rond tuinen wordt gezien. Daarbuiten schaars. De 8^e waarneming van deze soort in de NVP-database.



Tweestreepgrasuil, *Mythimna turca*. Een ongewone soort die alleen in zuid-Nederland lokaal wordt waargenomen. De laatste jaren wel wat frequenter dan daarvoor. De 4^e waarneming van deze soort in de NVP-database.



Gekraagde grasuil, *Mythimna ferrago*. Een gewone vlinder in allerlei biotopen met geschikte grassen. De 11^e waarneming van deze soort in de NVP-database.



Koperuil, *Diachrysia chrysitis*. Een gewone, maar erg mooie soort die in heel Nederland gezien kan worden in allerlei biotopen. De 38^e waarneming van deze soort in de NVP-database.