

# Rot fruit: geweldig voor nachtvlinders

Tekst:  
Kars Veling  
De Vlinderstichting

Het najaar is een goede tijd om te stropen of smeren. Dan bloeien er niet zoveel planten en kun je nachtvlinders aanlokken met een zoet mengsel van (suiker)stroop met extra suiker en andere ingrediënten zoals diverse soorten alcohol. Paul Hoekstra smeerde op 9 oktober 2009 in een boomgaard in Beusichem, met verrassend resultaat.

Hij smeerde de stroop aan het begin van de avond op tientallen bomen in een pruimenboomgaard, die niet volledig was geoogst en waarin hier en daar nog de pruimen hingen. Ze waren inmiddels al erg overrijp en zelfs al ingedroogd. Het smeren leek een weinig succesvolle onderneming, want na de eerste ronde stond de teller nog op nul vlinders. Ook tijdens de tweede ronde zaten er geen vlinders op de stroop. Tot hij plotseling een nachtvlinder in zijn zaklamp kreeg die boven hem fladderde. Hij zag de vlinder landen op een al helemaal verrotte pruim; het dier begon direct na de landing te drinken. Toen Paul de boomgaard verder inspecteerde, telde hij er 96 nachtvlinders, verdeeld over 17 soorten, allemaal op de nog in de boom hangende rotte pruimen. Naast algemene soorten zoals bruine herfstuil (37 vlinders), zwartstipvlinder (24 vlinders) en variabele herfstuil (7 vlinders) werden er ook zeldzamere soorten aangetroffen zoals de iepengouduil en de coniferenuil. Op het smeer is trouwens die hele avond geen enkele nachtvlinder gevonden, wel wat pissebedden en twee soorten loopkevers.

In het najaar, tot in december toe, zijn er nog steeds flink wat nachtvlinders actief. Ze zijn te vinden door bij verlichting te kijken, waarop je bijvoorbeeld de kleine wintervlinder vindt. Ook op laat bloeiende planten, zoals klimop kun je nachtvlinders aantreffen zoals de zwart-

In 2010 wordt er weer massaal naar nachtvlinders gekeken tijdens de Nationale Nachtvlindernacht. Dit jaar vindt hij plaats op 9 juli. Kijk voor mee informatie op de nieuwe website [www.nachtvlindernacht.nl](http://www.nachtvlindernacht.nl).

vekwinteruil. Maar zoals uit bovenstaand voorbeeld blijkt, ook rot fruit is zeer aantrekkelijk. Op gevallen fruit onder bomen kun je nachtvlinders aantreffen, maar ook op druiven die niet zijn geoogst zijn ze te vinden. Een aantal nachtvlinders is als het echt koud is in winterrust, maar deze worden in het vroege voorjaar weer actief. De zwartvekwinteruil en de bosbesuil bijvoorbeeld vliegen in oktober, maar ook in wat minder koude nachten in februari al zijn ze weer aan te lokken. Fruit hangt er dan niet meer en ook de klimop is uitgebloeid, dus dan is het stropen een prima methode.

## Waargenomen nachtvlinders 9 oktober 2009, boomgaard Beusichem

Bruine herfstuil	37
Zwartstipvlinder	24
Variabele herfstuil	7
Geelbruine herfstuil	1
Wilgengouduil	11
Gewone gouduil	1
Iepengouduil	1
Wachtervlinder	1
Huismoeder	2
Agaatvlinder	3
Witstipgrasuil	1
Grote worteluil	2
Putu-uil	1
Zwarte-c-uil	1
Coniferenuil	1
Gewone breedvleugeluil	1
Herfstrietboorder	1



Zwartstipvlinder op pruim.



Bruine herfstuil op pruim.