

Bezoekdatum dd/mm/jjjj:

Routenummer:

Teller:

Aantalsklassen:

1. weinig: 1-10 per sectie
2. regelmatig: 11-50 per sectie
3. veel: 51-500 per sectie
4. zeer veel: meer dan 500 per sectie

Groep	Teleenheid	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Blauwe knoop / Knautia	bloemhoofdje																				
Braam	bloem																				
Buddleja (Vlinderstruik)	bloemenpluim																				
Distels	bloemhoofdje																				
Dophei	bloemhoofdje																				
Gele composieten	bloemhoofdje																				
Kattenstaart	bloeistengel																				
Knoopkruid	bloemhoofdje																				
Koninginnenkruid (Leverkruid)	bloemscherf																				
Kruisbloemigen	bloeistengel																				
Rood-paars-blauwe Lipbloemigen	bloeistengel																				
Schermbloemigen	bloemscherf																				
Slangenkruid / Ossentong	bloeistengel																				
Struiken	bloeiende struik																				
Struikhei	bloeistengel																				
Vlinderbloemigen	bloeistengel																				
Overige composieten	bloemhoofdje																				
Overige nectarplanten	bloeistengel																				
Belangrijkste soorten overige nectarplanten:																					

Toelichting: z.o.z.

De aan- of juist afwezigheid van nectarplanten kan belangrijk zijn voor het aantal vlinders dat u op uw route ziet. Vier keer in het seizoen wordt u verzocht om tijdens het lopen van elke sectie van een route te kijken welke nectarplanten in bloei staan.

Aan het einde van de sectie kunt u de gegevens invullen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar de bovenstaande 18 (groepen van) soorten. De groep 'Overige nectarplanten' graag alleen tellen als u weet/ziet dat er ook vlinders gebruik van maken. Bij het bepalen van het aantal bloeiende nectarplanten wordt gekeken naar het aantal teleenheden dat per soortengroep in de sectie aanwezig is. Hiervan wordt een schatting gemaakt volgens vier aantalsklassen (zie boven de tabel).

Als er dus één braamstruik met 15 bloemen in een sectie groeit, dan krijgt deze klasse 2. Als er 5 bloeiende pinksterbloemen in de sectie staan (met verschillende bloemen per bloeistengel), krijgt de pinksterbloem toch klasse 1. Klasse 4 geldt vooral voor grote braamstruiken en composieten met veel bloemhoofdjes.

Toelichtingstabel

Groep	Teleenheid	Soorten
blauwe knoop / knautia	bloemhoofdje	ook evt. duifkruid
braam	bloem	alle braamsoorten
buddleja (vlinderstruik)	bloemenpluim	
distels	bloemhoofdje	bijv. akkerdistel, kale jonker, speerdistel, maar ook andere distelsoorten
dophei	bloemhoofdje	
gele composieten	bloemhoofdje	o.m. paardenbloem, havikskruid, leeuwentand, biggenkruid, boerenwormkruid, jacobskruid
kattenstaart	bloeistengel	
knoopkruid	bloemhoofdje	ook evt. centaurie-soorten
koninginnenkruid (leverkruid)	bloemscherm	
kruisbloemigen	bloeistengel	bijv. koolzaad, look-zonder-look, pinksterbloem
rood-paars-blauwe lipbloemigen	bloeistengel	hondsdrif, marjolein, kruipend zenegroen, munt, tijm, brunel, veldsalie
schermbloemigen	bloemscherm	m.n. fluitenkruid, berenklauw, engelwortel, peen, pastinaak, zevenblad
slangenkruid / ossentong	bloeistengel	
struiken	bloeiende struik	m.n. liguster, vuilboom, meidoorn
struikhei	bloeistengel	
vlinderbloemigen	bloeistengel	m.n. klaver, rolklaver, lathyrus, wikke, luzerne
overige composieten	bloemhoofdje	bijv. margriet, duizendblad, (schub)kamille, klit, zeeaster
overige nectarplanten	bloeistengel	bijv. wilgenroosje, valerian, koekoeksbloem, Robertskruid, reigersbek. Zijn het planten waarvan je zeker weet dat vlinders er nooit op komen? Dan mag je ze overslaan.